

Massnahmen zur Schadensminderung und differenzierte Behandlungsangebote haben bis heute zu einer Verbesserung der Situation der Konsumierenden geführt. Trotzdem bleibt Heroin auf den globalisierten Drogenmärkten sehr präsent und stellt weiterhin eine wichtige gesundheitspolitische Herausforderung dar. So bleibt das Bedürfnis bestehen, über den Stoff, die Risiken des Konsums sowie über die Möglichkeiten, die Schäden zu mindern und den Ausstieg zu erleichtern, zu informieren.



Heroin

Heilmittel, Todesdroge und verschreibungspflichtiges Medikament

Nachdem Opium und opiumhaltige Mischungen für Jahrtausende als Heilmittel gedient hatten, wurde Heroin erstmals 1874 vom Engländer C. R. A. Wright im Chemielabor hergestellt; weniger später wurde es von der chemischen und pharmazeutischen Industrie in Deutschland (Bayer, 1898) und der Schweiz (Basler Chemie) in grossen Mengen produziert und als gängiges Arzneimittel vermarktet.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam es unter dem Einfluss moralischer, medizinischer und politischer Vorstellungen zu einer Verschärfung der Drogenpolitik gegen Opium und die mit ihm verwandten Substanzen. Der medizinische Nutzen des Heroins wurde in Frage gestellt und seine soziale Schädlichkeit betont. Unter dem Druck internationaler Abkommen

zur Drogenkontrolle wurde Heroin mehr und mehr als «Todesdroge» betrachtet und auch in der Schweiz 1924 dem ersten «Bundesgesetz betreffend Betäubungsmittel» (BtmG) unterstellt. Herstellung, Handel und Abgabe unterlagen danach staatlicher Kontrolle.

Ein Konsumverbot wurde erst 1975 verfügt. Seither kann vorsätzlicher Heroinkonsum mit Busse belegt werden. Medizinisch oder wissenschaftlich begründete Ausnahmen sind weiterhin möglich. Ende der achtziger Jahre entstanden in mehreren Schweizer Städten offene Drogenszenen, in denen sich eine wachsende Anzahl von schwer Abhängigen bewegte und dem hohen Risiko von HIV-Infektion, Beschaffungskriminalität und Prostitution aussetzte. Im Rahmen der gesetzlichen Aus-

nahmeregelungen für Heroin wurde 1994 ein wissenschaftlicher Versuch zur ärztlichen Heroinverschreibung gestartet. Neben anderen Massnahmen (wie Spritzenabgabe, Einrichten von Anlauf- und Kontaktstellen) wurde 1999 mit der ärztlichen Verschreibung von Heroin begonnen. Die so genannte heroingestützte Behandlung (HeGeBe) gelangte nach vielen kontroversen Diskussionen im Juni 1999 als dringlicher Bundesbeschluss zur Abstimmung und wurde vom Volk deutlich angenommen. Mit dem revidierten Betäubungsmittelgesetz, welches im November 2008 in einer Volksabstimmung gutgeheissen wurde, ist die HeGeBe nun langfristig gesetzlich verankert.



Heroin, ein halb-synthetisches Opiat

Opiate sind Substanzen, die direkt aus der Opiumpflanze (Schlafmohn) gewonnen werden. Heroin (in der Szenesprache auch Sugar, H, Gift) wird zu den halbsynthetischen Opiaten gezählt. Es wird im Chemielabor hergestellt, indem die aus Rohopium gemachte Morphinbase mit Essigsäureanhydrid gekocht wird. Die so hergestellte Substanz hat die chemische Bezeichnung Diacetylmorphin. Sie erhielt wegen ihrer «heroischen» Wirkung den Handelsnamen Heroin. Heroin wirkt wie Morphin, nur stärker, und es gelangt schneller an die Opiatrezeptoren im Gehirn.

Wirkung

Heroin vermindert:

- Schmerz
- Angst und Depressionen
- Hustenreiz und Atembeschwerden
- Durchfall

Heroin steigert:

- Euphorie
- Wohlbefinden und Selbstzufriedenheit
- Beruhigung

Heroin löst nach wenigen Sekunden den so genannten Flash aus. Danach stellt sich ein Zustand der Beruhigung ein. Die Droge stillt Schmerzen und versetzt den Konsumierenden in eine euphorische Stimmung. Sie übt aber auch eine erregende Wirkung auf das Zentralnervensystem aus: Das Selbstvertrauen nimmt zu, Ängstlichkeit und Anspannung verfliegen. Eine Heroin-dosis wirkt fünf bis acht Stunden nach dem Konsum nur noch halb so stark. Heroin bzw. seine Abbauprodukte können im Blut während einiger Stunden, im Urin während zwei bis drei Tagen nachgewiesen werden.

Konsumformen und Drogenmarkt

Ein grosser Teil der Heroinkonsumierenden in der Schweiz spritzt sich die Droge intravenös. Heroin wird aber auch geraucht oder gesniffet; daneben hat sich insbesondere das Inhalieren von Heroindämpfen (Folienrauchen oder den Drachen jagen) verbreitet. Je nach Art des Konsums sind Wirkung und Risiken unterschiedlich.

Auf der Gasse käufliches Heroin ist weiss bis beige und pulverförmig oder kristallin. Es wird hauptsächlich aus der Türkei, dem Balkan und in den letzten Jahren wieder vermehrt aus der ehemaligen Sowjetunion und Afghanistan in die Schweiz geschmuggelt. Die Schwarz-

marktpreise unterliegen starken Schwankungen, sinken in letzter Zeit aber durch die globale Überproduktion von Rohopium. Um die Wirkungen zu verändern, wird Heroin oft mit anderen Drogen wie Kokain vermischt (Speedball, Cocktail). Gassenheroin wird oft mit Gips, Traubenzucker, Schmerzmitteln, zum Teil sogar mit Strychnin und ähnlichen Giften gestreckt, so dass seine Reinheit stark variiert. Gerade diese Mischungen stellen ein nicht kalkulierbares Risiko dar und führen zu Unfällen mit Überdosen.

Risiken und Schäden

Kurzfristige Folgen

Beim Spritzen von Heroin besteht das Risiko einer Infektion. Es können HIV (Aids) und Leberinfektionen (Hepatitis) übertragen werden. Unsachgemässe oder unhygienische Injektionen können Blutvergiftungen und Abszesse verursachen. Während Infektionen beim Rauchen, Inhalieren und Sniffen seltener auftreten, bestehen bei diesen Konsumformen andere Risiken, so etwa die Schädigung von Atemwegen, Lungen und Nasenschleimhäuten. Heroinkonsum birgt auch immer das Risiko von akuten Todesfällen durch Überdosis oder allergische Schocks.

Es gibt kaum mehr Drogenkonsumentinnen und -konsumenten, die ausschliesslich von Heroin abhängig sind. Beim verbreiteten Mischkonsum von illegalen Drogen (Heroin mit Kokain, Cannabis) oder legalen Drogen (alkoholische Getränke, Benzodiazepine) kann es zu schwer kalkulierbaren Wirkungen kommen.

Langfristige Folgen

Die Gefahr psychischer und physischer Abhängigkeit ist gross. Entgegen der verbreiteten Meinung bringt der dauerhafte Gebrauch von (reinem) Heroin nicht automatisch Organ-

vergiftungen mit sich, und er hat nur geringe körperliche Folgen. Längerfristige körperliche Schädigungen können durch Verunreinigungen des Heroins entstehen. HIV-Infektionen, Hepatitis B und C und Mangelkrankungen sind durch die Lebensumstände (schlechte Injektionshygiene, Sprizentausch, Prostitution, mangelhafte Ernährung) bedingt.

Ob Heroingebrauch langfristig die Psyche schädigt, ist nicht eindeutig geklärt. Studien zeigen, dass rund 80 Prozent der Opiatabhängigen an einer oder mehreren psychischen Störungen leiden (Phobien, Angststörungen, Depressionen, Persönlichkeitsstörungen; Frei/Rehm 2002). Die psychischen Erkrankungen müssen aber nicht unbedingt eine Folge des Heroinkonsums sein. Sie können parallel zur Heroinabhängigkeit verlaufen oder eine Ursache für eine Suchtentwicklung sein.

Die sozialen Risiken wie Beschaffungskriminalität, Beschaffungsprostitution, Kleindealerei und soziale Verwahrlosung sind weniger eine direkte Folge des Heroinkonsums als vielmehr eine Folge der Illegalität der Droge.



Heroinkonsum in der Schweiz

In der Schweiz tauchte Heroin Mitte der siebziger Jahre erstmals in grösseren Mengen in den städtischen Drogenszenen auf. In den achtziger und neunziger Jahren stieg die Zahl der Heroinkonsumierenden sprunghaft an. Genaue Statistiken zum Heroinkonsum sind jedoch nicht vorhanden. Gemäss Schätzungen aus den neunziger Jahren waren in der Schweiz ungefähr 30 000 Personen von Heroin und/ oder Kokain abhängig. Eine andere Schätzung (Bundesamt für Gesundheit) kommt – basierend auf der Statistik der Methadonbehandlungen, der drogenbedingten Todesfälle und der polizeilichen Verzeigungen wegen Heroinkonsums –

auf 18 500 bis 25 500 Heroinabhängige für das Jahr 2002. Die Resultate der Schweizerischen Gesundheitsbefragung weisen zudem darauf hin, dass die Anzahl Personen, die mindestens einmal im Leben Heroin konsumiert haben, zwischen den Jahren 2002 und 2007 stagniert hat.

Die heroingestützte Behandlung «HeGeBe» soll schwerst heroinabhängigen Personen mittels einer streng kontrollierten Verschreibung von pharmazeutischem Heroin und begleitet von einer umfassenden psychosozialen Betreuung und ärztlicher Behandlung helfen. 2012 waren in der Schweiz insgesamt 1578

Patienten und Patientinnen in einem der 23 Zentren, davon 2 Zentren in Strafanstalten, für heroingestützte Behandlung in Therapie. Die heroingestützte Behandlung wird in 11 Kantonen angeboten. (BAG, HeGeBe-Jahresbericht 2012).

Bei der Substitutionsbehandlung wird Heroin durch ein ärztlich verschriebenes Opioid ersetzt, meistens handelt es sich dabei um Methadon. Im Jahr 2011 wurden in der Schweiz 18 017 Personen mit Methadon substituiert, wobei die Angaben aus zwei Kantonen fehlen. (BAG, Nationale Methadonstatistik 2011).

Lebensgefährlich: Heroin-Überdosis

Todesfälle durch eine Überdosis Heroin – auch in Verbindung mit anderen Substanzen – kommen weiterhin vor, obwohl die Zahl der Drogentoten seit 1995 abgenommen hat.

Üblicherweise sind klinisch drei Hauptsymptome erkennbar:

- Bewusstseinsstrübung
- Verminderte Atmung (flach, unregelmässig, weniger als 12 Atemzüge pro Minute)
- Stark verengte Pupillen

Weitere klinische Zeichen einer Überdosierung sind:

- Abgeschwächte Reflexe
- Schwacher Puls
- Tiefer Blutdruck

Ausserdem können Komplikationen wie Lungenödem (Wasseransammlung in der Lunge), Hirnödem (Wasseransammlung im Gehirn), Schock und Koma auftreten.

Das Risiko einer Überdosis hängt stark von individuellen Faktoren ab. Deshalb kann nicht eindeutig gesagt werden, ab welcher Dosis Heroin akut gefährlich wird. Für eine Person, die nicht an Heroin gewöhnt ist, kann bereits eine intravenöse Dosis von 20 Milligramm äusserst gefährlich sein. Das Risiko ist insbesondere dann hoch, wenn die eingenommene Heroindosis unbekannt ist, wie dies bei verunreinigtem Schwarzmarkt-Heroin oft der Fall ist. Die beigemischten Streckstoffe oder die Kombination der Droge mit Alkohol und Beruhigungsmitteln tragen häufig zu allergischen Schocks sowie Atem- und Kreislaufdepressionen als Todesursache bei.

Heroin und Schwangerschaft

Heroin gerät über die Plazenta in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes und entfaltet auch dort seine Wirkungen. Bei einem abrupten Entzug leidet auch der Fötus. Heroin konsumierende Frauen erkennen die Anzeichen einer Schwangerschaft oft sehr spät, da sie Übelkeit und Erbrechen für Entzugssymptome halten und die Monatsblutung bei ihnen auch ohne Schwangerschaft häufig ausbleibt.

Risiken für die Schwangere:

- Vorzeitige Wehen
- Vorzeitige Ablösung der Plazenta
- Fehlgeburt
- Frühgeburt

Risiken für den Fötus:

- Wachstumsverzögerung
- Störung der Sauerstoffversorgung

Risiken für das Neugeborene:

- Frühgeburt (Hirnschäden, Atemprobleme)
- Niedriges Geburtsgewicht und geringer Kopfumfang
- Entzugssymptome (exzessives Saugen, Muskelspasmen, Fieber, Schlaf- und Ernährungsstörungen)
- HIV- und Hepatitis-Risiko bei infizierter Mutter

Eine Substitutionsbehandlung (z.B. mit Methadon), verbunden mit psychosozialer Betreuung, gilt als angemessene Behandlung für Mutter und Kind. Ein abrupter Entzug erhöht das Risiko einer Totgeburt.

Die Muttermilch enthält bei Heroin konsumierenden Frauen Anteile der Droge.



Heroinabhängigkeit und Entzug

Heroin hat ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial und kann zu psychischer und körperlicher Abhängigkeit führen.

Eine Abhängigkeit von Heroin bedeutet:

- Unstillbares Drogenverlangen
- Kontrollverlust beim Konsum
- Starke Entzugserscheinungen bei Beendigung oder Reduktion des Konsums
- Toleranzentwicklung (d.h. die Dosis muss erhöht werden, um die gleiche Wirkung zu erzielen)
- Fortschreitende Vernachlässigung anderer Aktivitäten und Interessen
- Fortsetzen des Konsums trotz Gesundheitsschäden

Ein Entzug zeigt sich vor allem in Zittern, Schwitzen, Durchfall, Schmerzzuständen und psychosomatischen Symptomen (zum Beispiel Schlaflosigkeit, Unruhe, Angst). Ein «kalter Entzug» wird ohne Unterstützung durch Medikamente durchgeführt. Seine Symptome beginnen etwa acht Stunden nach dem letzten Heroinkonsum, erreichen 36 bis 72 Stunden nach der letzten Injektion ihren Höhepunkt und sind nach sieben bis zehn Tagen überstanden. In einem «warmen Entzug» werden die Entzugserscheinungen durch Medikamente gelindert. Die Rückfallgefahr nach einem Entzug ist bei Heroinabhängigkeit gross, besonders wenn die Betroffenen ins Drogenmilieu zurückkehren.



Prävention

Unter dem Einfluss einer pragmatischen Drogenpolitik (Viersäulenmodell) hat sich die Situation der Heroinkonsumierenden seit den achtziger und neunziger Jahren verbessert. Mit einer breiten Palette an Suchtbehandlungen und niederschweligen Anlaufstellen können heute die gesundheitlichen und sozialen Schädigungen des Heroinkonsums vermindert werden. Die Angebote verfolgen unterschiedliche Ziele: Abstinenz, Heroinverschreibung, Substitution und Schadensminderung. Im Bereich der Schadensminderung stehen Einrichtungen wie Kontakt- und Anlaufstellen zur Verfügung, in denen die Konsumierenden betreut und beraten werden und saubere Spritzen und Nadeln beziehen können. Gezielte Information ist wichtig.

Mit schadensmindernden Massnahmen kann die Lebenssituation von Heroinabhängigen verbessert werden. Doch es bleibt erstes Ziel der Prävention, den Einstieg zu verhindern, gerade bei einer so stark abhängig machenden Droge. Neben der Grundaufgabe, über Wirkungen und Risiken zu informieren, richtet sich die Prävention vor allem an Zielgruppen, die einen oder mehrere Risikofaktoren für ein Suchtverhalten aufweisen, zum Beispiel familiäre Schwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, geringe Stressresistenz. Die Früherkennung von Risikosituationen, gefolgt von einer angemessenen Intervention, ist ein wichtiges Instrument der Prävention.